

インフルエンザHAワクチン予防接種予診票

任意接種用

接種希望の方は、太ワカ内の記入ください。箇所欄にはどちらかに印をつけてください。
お子さんの接種を希望される場合は、健康状態をよく把握している保護者の方がご記入ください。

診療前休温

度 分

住 所	TEL ()	-
フ リ ガ ナ	男 · 女	
受ける人の氏名 (保護者の氏名)	生年 月日	年 月 日生 (確 か月)

質問事項	回答欄	医師記入欄
1. 今日受けたインフルエンザの予防接種について説明文(裏面)を読んで理解しましたか	いいえ	はい
2. 今日、普段と違った異常に気がかりなことがありますか	はい 気的()	いいえ
3. 現在、何かの病気で医師にかかることがありますか	はい 何()	いいえ
4. 最近1ヶ月以内に病気になりましたか	はい 病名()	いいえ
5. 特別な病気(先天性異常、心臓・腎臓・肝臓・脳神経の病気、免疫不全症、血液疾患、その他の病気)にかかることがありますか	はい 病名()	いいえ
6. 薬や食品(特に頭痛、頭内、その他の原因のもの)で皮膚に発疹や荨麻疹が出来たり、体の具合が悪くなっていますか	はい 薬名()	いいえ
7. けいれんを起こすことがありますか	はい(発作は 年 月 日ごろ)	いいえ
8. 今までに間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患と診断されたことがありますか	はい	いいえ
9. 今日受けたインフルエンザ予防接種は、今シーズン1回目ですか	いいえ、既回数(月 日)	はい
10. インフルエンザ予防接種の際に具合が悪くなっていますか	はい 治療名()	いいえ
11. インフルエンザ以外の予防接種の際に具合が悪くなっていますか	はい 単回(月 日) 予防接種名()	いいえ
12. 1ヶ月以内に予防接種を受けましたか	はい	いいえ
13. 近親者に先天性免疫不全症の方がありますか	はい	いいえ
14. 1ヶ月以内に近親者や周囲で麻疹(はしか)、風疹(みずぼうそう)、水痘(みずぼうそう)、おとふくろけなどにかかることがありますか	はい 病名()	いいえ
15. 女性の方に】現在妊娠していますか	はい	いいえ
16. 【接種を受けられた方がお子さんの場合】分娩時、出産時、乳幼児健診などで異常がありましたか	はい 具体的に()	いいえ
17. その他、健康状態のことで医師に伝えておきたいことや質問があれば、具体的にご記入ください		

医師記入欄		
以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は(実施できる ・ 見合わせた方が良い)と判断します。		
本人又は、保護者に対して、予防接種の効果、副反応及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく賃償について説明しました。		
医師の署名又は記名押印		

本人(保護者)記入欄		
医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で接種することに (同意します ・ 同意しません)。		
署名	(代筆者の場合: 結婚)	(お接種者が行なさない場合は代筆者が 署名し、捺印または捺印してください。)
使用ワクチン名	用法・用量	実施場所・医師名・接種日時
<input type="checkbox"/> インフルエンザHAワクチン(KM)B	皮下接種 0.5mL(0.5ml以上) 0.25mL(0.25ml以上) 製造: Meiji Seika ファルマ株式会社	実施場所: 医師名: 接種日時: 年 月 日 時 分

ご記入いただきました個人情報はインフルエンザワクチン接種の予防に関してのみ使用いたします。

インフルエンザHAワクチンの接種について

任意接種用

インフルエンザHAワクチンの接種に当たって、受けられる方の健康状態をよく把握する必要があります。そのため、表面の予診票にできるだけ詳しくご記入ください。お子さんの接種を希望される場合は、健康状態をよく把握している保護者の方がご記入ください。

ワクチンの効果と副反応

インフルエンザHAワクチンの接種により、インフルエンザを予防したり、症状を軽くすることが期待されます。また、インフルエンザによる合併症や死を予防することが期待されます。

一方、副反応は一般的に軽微です。注射部位が赤くなる、腫れる、硬くなる、熱をもつ、痛くなる、しびれる、小水泡などがみられることがあります。数日以内に自然に消失します。また、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、咳、嘔吐、嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、關節痛、筋肉痛、筋力低下などが起こることがあります。過敏反応として、発疹、荨麻疹、湿疹、紅斑、多形紅斑、かゆみ、血管性浮腫などがあります。その他に血管炎、頭面神經炎、耳膜炎などの麻痺、末梢性ニューロパシー、失血、血管迷走神経反応、ブドウ眼膜、振戻が現れることがあります。強い頭アレルギーなどのあれば強い過敏反応を生じる可能性がありますので、接種前に必ず医師に申し出てください。重大な副反応としては、次のような副反応が起こることがあります。(1)ショック、アナフィラキシー(蕁麻疹、呼吸困難、血管性浮腫など)。(2)急性散在性血管炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)。(3)筋炎・筋症、脊髄炎、視神經炎、(4)ギラン・バレー症候群(両手足のしづれ、歩行障害など)、(5)けいれん(筋性けいれん含む)、(6)肝機能障害、黄疸、(7)喘息発作、(8)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(9)血管炎(IgA血管炎、好酸球性多発血管炎、内肉芽腫症、白血球破碎性血管炎など)。(10)間質性肺炎、(11)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、急性汎性発赤性皮膚症候群、(12)ネローゼ症候群(いずれも頻度不明)。その他にも不明・不安な症状が現れたり、これらの症状が疑われる場合に接種医又は近くの医療機関にご相談ください。

予防接種を受けることができない人

- 明らかに発熱のある人(37.5℃以上の人に)
- 重篤な急性疾患にかかることがあることが明らかな人
- 過去にインフルエンザHAワクチンの接種を受けて、アナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する呼吸困難、全身性の荨麻疹などを伴う重症のアレルギー反応)を起こしたことがある人
- 他の医薬品接種を受けてアナフィラキシーを起こした人は、接種を受ける前に医師にその旨を伝えて判断を仰いでください。
- その他、医師が予防接種を受けることが不適当と判断した人

予防接種を受けるに際し、医師とよく相談しなければならない人

- 心臓病、脳梗塞、肝臓病や血液の病気などの人
- 貧血が悪く、医師、保健師の指導を受けていた人
- 過去に予防接種を受けた時に、2日以内に発熱、発症、荨麻疹などのアレルギーを疑う貴方がみられた人
- 漢方投与又は食事(頭部、頸部など)で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことのある人
- 過去にけいれんを起こしたことがある人
- 過去に免疫不全症がなされている人及び近親者に先天性免疫不全症の人が多い人
- 狂犬の可能性がある人
- 間質性肺炎、気管支炎などの呼吸器疾患のある人

予防接種を受けた後の注意

- インフルエンザHAワクチンの接種を受けたあと30分間は、急な副反応(苦しさ、荨麻疹、咳など)が起きることがあります。医師機関にいるなどして、様子を観察し、医師とすぐ連絡を取るようにしておきましょう。
- 接種当日は、接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。激しい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- 接種当日の入浴は控えられますが、注射した部位をこすることはやめましょう。
- 万一、高熱やけいれん等の異常な症状が出た場合は、速やかに医師の診察を受けてください。

接種日	月 日()	度 分
当日は受付に	時 分	おこしください

インフルエンザHAワクチンの仕事の接種について、ワクチンを正しく使用したにもかかわらず、その副反応により入院・治療が必要になるほど重篤な併発症が生じた場合は、健診を受けた人、又は運営者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて、医療機関を行なう制度があります。詳しくは独立行政法人医薬品医療機器総合機構のホームページをご覧ください。照合表は右記のとおりです。

独立行政法人 医薬品医療機器総合機構 法規制制度相談窓口
〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-2-2 霞が関ビル
電話: 0120-149-931(フリーダイヤル)
URL: https://www.pmdtg.jp/re lief/service/ad-advisers/0020.html